

**ZALECENIA DLA PACJENTA PO LECZENIU
ENDODONTYCZNYM (leczeniu kanałowym)**

- Nie należy gryźć ani przeżuwać pokarmów po stronie gdzie odbywa się leczenie kanałowe aż do momentu całkowitego odbudowania zęba wypełnieniem lub koroną. W przeciwnym wypadku osłabiona struktura zęba może pęknąć znacznie komplikując leczenie.
- Nie spożywać posiłków dopóki działa znieczulenie.
- Ząb leczony kanałowo może być wrażliwy, tkliwy przez parę dni po zabiegu, zwykle po paru dniach objawy te ustępują samoistnie.
- Po zakończeniu leczenia kanałowego mogą (ale nie muszą) występować chwilowe dolegliwości bólowe leczonego zęba przez około 7 dni od momentu zakończenia leczenia. W razie konieczności można zażyć leki przeciwbólowe lub przeciwzapalne po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia obrzęku (opuchlizna policzka) należy skontaktować się z lekarzem.
- Każdy ząb po leczeniu kanałowym powinien być docelowo zaopatrzony protetycznie.
- 6 miesięcy po zakończeniu leczenia kanałowego należy wykonać kontrolne zdjęcie RTG.